

平成31年度(令和元年度) 子ども定期予防接種

子どもの定期予防接種は、保護者が受けさせるように努めなければならない予防接種です。冊子「予防接種と子どもの健康をよく読み、医師から接種について詳しい説明を受け、疾病や予防接種の内容をよく理解した上で、体調の良い時に接種を受けましょう。

ワクチン	標準接種年齢		接種対象年齢	間隔	
ヒブ (注1)	初回	1回目	生後2か月～7か月未満	生後2か月～1歳未満	27日以上 (標準的には27日～56日)
		2回目			
3回目					
追加	初回終了後7か月～1年1か月		5歳未満	初回終了後7か月以上	
小児用肺炎球菌 (注1)	初回 (注1)	1回目	生後2か月～7か月未満	生後2か月～2歳未満	27日以上
		2回目			
		3回目			
追加	生後1～1歳3か月未満		1歳～5歳未満	初回終了後60日以上	
四種混合 (ジフテリア+百日ぜき+破傷風+ポリオ)	1期初回	1回目	生後3か月～1歳未満	生後3か月～7歳6か月未満	20日以上 (標準的には20日～56日)
		2回目			
		3回目			
1期追加	1期初回終了後1年～1年半		7歳6か月未満	1期初回終了後6か月以上	
B型肝炎	1回	生後2か月		1歳未満	1回目終了後27日以上 1回目終了後139日以上
	2回目				
	3回目				
BCG(結核)		生後5か月～8か月未満		1歳未満	
水痘(水ぼうそう)	1回目	1歳～1歳3か月未満		1歳～3歳未満	3か月以上
	2回目	1回目終了後6か月～1年			
麻しん風しん(MR)	1期	1回目	1歳～2歳未満	1歳～2歳未満	
	2期	2回目	小学校就学前の1年間	小学校就学前の1年間	
	市独自措置	1回目未接種の2歳～高校3年生相当(注2)			
		2回目未接種の小学1年生～高校3年生相当(注2)			
日本脳炎	1期初回	1回目	3歳	生後6か月～7歳6か月未満(注3)	6日以上 (標準的には6日～28日)
		2回目			
	1期追加	4歳		7歳6か月未満(注3)	1期初回終了後6か月以上 (標準的にはおおむね1年)
2期	9歳		9歳～13歳未満(注3)		
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期	11歳		11歳～13歳未満	
【女子のみ】 ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防)	1回			小学校6年生～高校1年生相当	1回目終了後1か月又は2か月(注4) 1回目終了後6か月(注4)
	2回目	中学1年生			
	3回目				

注1)標準的な接種回数は4回ですが、接種開始時期やその後の接種間隔によって接種回数異なります。

注2)麻しん・風しんワクチン1回目または2回目の接種が未接種の方が対象で、未接種分について静岡市の負担で接種できます。(静岡市の制度)

注3)特例対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方)は20歳の誕生日の前日までの間、接種できます。また、平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた方は、1期初回と1期追加の未接種分がある場合、9歳から13歳の誕生日の前日までの間に未接種分を接種できます。

注4)接種するワクチンによって接種間隔が異なります。スケジュールについては医師に御相談ください。

※上記は平成31年4月現在の情報です。予防接種制度はたびたび変更がありますので、不明な点は保健予防課(249-3173)までお問い合わせください。